

1. Bâtiment

- Vide sanitaire pendant 2 semaines
 - Nettoyage du bâtiment (*Temps de ce travail ~14 heures*)
 - Enlever la paille ou copeaux au sol
 - Nettoyer à l'aide d'un nettoyeur à haute pression les murs et les appareils
 - Désinfecter
- Mise en chauffe
 - Mise en service du chauffage 8 heures avant l'arrivée des poussins
 - La température doit atteindre 33 degré sous les radiants.
- Préparation pour les poussins
 - Descente des radiants à la hauteur nécessaire
 - Descente des pipettes d'eau à la hauteur des poussins
 - Mise en place des aliments dans les mangeoires
 - Mise en place sous les rangées de radiants un tapis en carton ou seront déposés les poussins

2. Arrivée des poussins

Les 20 000 poussins arrivent par camion du couvoir d'AMILLY.

Des prélèvements de poussins sont effectués dans le camion, ces poussins seront examinés par un laboratoire afin de vérifier si le lot est sain.

Dans le camion les poussins sont dans des caisses

- Bleu pour les mâles
- Jaune pour les femelles

Chaque caisse contient de 100 à 103 poussins

Les caisses sont empilées sur des chariots qui sont amenés dans la zone de dépose des poussins. Puis par caisse les poussins sont déposés sur le tapis carton qui se trouve sous les radiants.

Pour la mise en place des 20 000 poussins il faut à 3 personnes pendant environ $\frac{1}{2}$ heure.

Les poussins commencent à manger de suite et ils trouvent de l'eau en frappant avec leur petit bec sur le rouge des pipettes.

3. Température

Elle est maintenue à 33 Degré pendant 5 jours

Ensuite elle baisse progressivement pour atteindre :

- 30 Degré le 10ème jour
- 28 Degré le 15ème jour
- 24 Degré le 25ème jour
- 20 Degré le 35ème jour
- 19 Degré le 40ème jour et jusqu'au départ pour l'abattage.

4. Alimentation

Du 1 jour au 10ème jour ils mangent de l'aliment "démarrage miette"

Du 10ème jour au 25 jour ils mangent de l'aliment "croissance miette"

Du 25ème jour jusqu'au départ pour l'abattoir de "croissance"

5. Composition de l'alimentation

Formules en granulées

Toutes les formules sont à bases de céréales blé, orge, maïs, tournesol et soja

6. Durée de l'élevage

45 jours pour les femelles pour un poids moyen de 1.8kg à 2 kg

55 jours pour les mâles pour un poids moyen de 2.9kg à 3kg

A leur arrivée au poids moyen les poulets partent pour l'abattoir

7. Vaccins

À la naissance les poussins sont vaccinés au couvoir

Un rappel est administré entre le 20 et 25ème jour à travers l'eau qu'ils boivent

8. Travail de l'éleveur

Passage journalier (le matin) pour ramasser les bêtes mortes (1 à 2 %) et il doit veiller au

- Bon état sanitaire du lot.
- Temps journalier ~ 1 heure